

TOPIRON^{WG} MICROQUEL



BILJNI STIMULATOR OBOGAĆEN EKSTRATIMA HUMINA I KOREKTOR NEDOSTATKA GVOŽĐA

Topiron je mikrogranulisano vodotopivo organomineralno đubrivo sa 6% vodorastvorljivog gvožđa (Fe), kompleksirano SLHA molekulima, vrlo efikasno u korekciji hloroze gvožđa preko korena.

PRIMENJENE TEHNOLOGIJE I DODACI



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- 6% gvožđa (Fe), kompleksirano SLHA molekulima
- 30% rastvorljivih huminskih ekstrata:
 - 25% rastvorljivih huminskih kiselina
 - 5% rastvorljivih fulvo kiselina
- Interval pH stabilnosti gvožđe helatne frakcije: 3 – 12
- Optimalno razlaganje u rastvoru za primenu

PREDNOSTI PRIMENE

- Produženo i postepeno delovanje na nedostatak gvožđa (Fe)
- Umanjuje efekte saliniteta smanjivanjem prisustva natrijuma (Na)
- Povećava nivo dostupnog fosfora (P), kalijuma (K), magnezijuma (Mg) i kalcijuma (Ca) kao i mikroelemenata bakra (Cu), mangana (Mn) i cinka (Zn)
- Pozitivno utiče na razvoj korenovog sistema
- Sprečava retrogradaciju katjona u zemljištu, oslobađajući mineralna jedinjenja i povećavajući zadržavanje vode u zemljištu

PREPORUČENE KOLIČINE I NAČIN PRIMENE

1,5 – 2 kg po hektaru folijarno i fertigacijom

PAKOVANJE 5 kg

Navedene količine i način primene đubriva su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene kao i za odgovarajuću preporuku ishrane bilja, molimo vas da se obratite Stručnoj službi ANIG d.o.o.



**MOŽE SE KORISTITI
U ORGANSKOJ I EKOLOŠKI
PRIHVATLJIVOJ PROIZVODNJI**



STRUČNA SLUŽBA

Dejan Šebić 063 562 162 • Slobodan Jovanović 069 2477 244 • Josip Bereš 069 779 470 • Bojan Lalatović 063 634 016

Generalni uvoznik i distributer:

ANIG d.o.o., bulevar Mihaila Pupina 181/II, 11070 Novi Beograd, 011 319 1477

www.anig.rs, anig@anig.rs



N – 6%, P₂O₅ – 30%, B – 8%, Mo – 2%, slobodne aminokiseline – 2%

ZA BOLJE ZAMETANJE I FORMIRANJE PLODOVA

Micro Quel Cuaje je vodotopivo đubrivo sa visokim sadržajem fosfora (P) kao ključnog elementa u fazi formiranja cvetnih pupoljaka i bora (B) kao ključnog elementa u fazama zmetanja, formiranja i razvoja plodova.

PRIMENJENE TEHNOLOGIJE



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Slobodne aminokiseline utiču na stvaranje proteina naročito pre cvetanja i u fazama cvetanja, zmetanja, formiranja i razvoja plodova
- Obezbeđuje dovoljne količine molibdena (Mo) biljnim kulturama naročito osetljivim na njegov nedostatak – kupusnjače, leguminoze, tikvice, krastavac i sl.
- Makro i mikro elementi zajedno sa slobodnim aminokiselinama formiraju AMINOAT, novi kompleksan molekul, koji ubrzava usvajanje hraniva iz đubriva i iz zemljišta

PREDNOSTI PRIMENE

- Brži rast i razvoj biljaka zbog energetskog doprinosa aminokiselina
- Bolje usvajanje hraniva i smanjenje gubitaka isparavanjem i ispiranjem (EFIFOIL)
- Optimizacija i ujednačavanje cvetanja, zmetanja, formiranja i razvoja plodova

PREPORUČENE KOLIČINE I NAČIN PRIMENE

1,5 – 2 kg/ha folijarno

PAKOVANJE 5 kg

Navedene količine i način primene đubriva su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene kao i za odgovarajuću preporuku ishrane bilja, molimo vas da se obratite Stručnoj službi ANIG d.o.o.



STRUČNA SLUŽBA

Dejan Šebić 063 562 162 • Slobodan Jovanović 069 2477 244 • Josip Bereš 069 779 470 • Bojan Lalatović 063 634 016

Generalni uvoznik i distributer:

ANIG d.o.o., bulevar Mihaila Pupina 181/II, 11070 Novi Beograd, 011 319 1477
www.anig.rs, anig@anig.rs